GioFil Banca Dati Sanitaria Farmaceutica

PRIMI RISULTATI STATISTICI SUGLI EFFETTI INDESIDERATI PROVOCATI DAL FARMACO ZYBAN

Londra , 26 febbraio 2001 UK MEDICAL NEWS,
Il farmaco Zyban a base di bupropione cloridrato e' stato approvato nel 2000 con l' indicazione terapeutica di aiuto alla cessazione dell' abitudine al fumo unitamente ad un supporto motivazionale in pazienti nicotino-dipendenti.
Il dipartimento della Sanita' Britannico, in data 12 Febbraio 2001 ha catalogato 3457 reports di eventi avversi correlati all' utilizzo del farmaco.
E' importante sottolineare che gli effetti riportati possono non essere correlati solamente all' utilizzo del farmaco ma possono essere correlati ad altre patologie oppure all' assunzione di altri farmaci o alla sospensione dell' assunzione di nicotina.
Oltre alla segnalazione di diversi effetti collaterali sono stati riportati 18 casi di morte in pazienti che comunque assumevano questo farmaco.
I casi riportati su 3457 reports sono: orticaria (485 casi), insonnia (459 casi), rash (449 casi), nausea (329 casi), mal di testa (323 casi), senso d' instabilita' (306 casi), angioedema (266 casi), depressione (183 casi), prurito (171 casi), tremore (168 casi), ansia (161 casi), dolore al petto (136 casi), secchezza delle fauci (121 casi), dispnea (110 casi), agitazione (108 casi), vomito (103 casi), aumentata sudorazione (91 casi), palpitazione (90 casi), dolori addominali (88 casi), costipazione (85 casi), dolori articolari (82 casi), attacchi epilettici (74 casi).

GioFil
Tutti i Diritti Riservati